

菠菜栽培技术

来源：RZ 编辑：RZ 发布：2009-09-03

荷兰菠菜是近几年来引进的蔬菜新品种。该品种主要有星火 65 (Salmon RZ F1)，其特点为早熟性好，耐寒，耐抽薹，叶片肥大，叶色深绿，纤维少、味甜、无涩味。生长期为 40 天左右，秋播时间一般在 9 月中旬至 10 月初，在元旦至春节期间即可上市，亩产 2500~3000 公斤；春播时间一般在春节后，在当地菠菜抽薹后的 4~5 月上市。现将种植技术介绍如下：

1. 整地：亩施优质有机肥 2000~3000 公斤、磷酸二铵 20 公斤、硫酸钾 30 公斤、过磷酸钙 20 公斤。
2. 做畦：畦宽 1.2 米，埂宽 20 厘米、高 15 厘米，畦内种 5 行菠菜，行距为 20 厘米或 15 厘米，株距为 5 厘米。荷兰菠菜也可起垄栽培，按 0.5 米的垄距起垄，垄面宽 30 厘米，播种 3 行。播种时采取点播方式，每穴 2 粒，覆土 1.5~2 厘米。
3. 间苗：苗出齐后，可间苗出售，每穴留一株。
4. 肥水管理：生长期间注意灌水追肥，促进植株生长。播后苗前进行一次浅锄松土，以达到保墒、除草的双重效果，或浇一次蒙头水以保全苗。在植株长出 3~4 片叶前，要注意保持土壤湿润，浇水 1~2 次并追肥。3~4 片叶后浅锄一次，并间去过密的弱苗，适当控制土壤湿度，保根深扎，以利越冬。在植株停止生长、土壤将冻时灌冻水。灌冻水时要掌握在土表昼化夜冻时灌一次大水，使水分渗透到土中。灌水过早时气温尚高，土壤失水过多，易造成土壤干旱死苗；灌水过晚时土壤冻结，大量水分不能渗入土里而形成表层冻壳，易引起植株缺氧死苗。有条件的地方可在冬季覆盖碎麦糠（秸）或盖小拱棚。
5. 采收：元旦至春节和春季至五一节前后，根据市场行情，捆把销售。