

番茄筋腐病

来源：RZ 编辑：RZ 发布：2010-07-23

中文名称：番茄筋腐病

英文名称：Tomato striped fruit

病源：生理失调

为害症状：主要发生在果实膨大至成熟期。果实受害，前期病果外形完好，隐约可见表皮下组织部分呈暗褐色，渐有自果蒂向果脐的条状灰色污斑，严重时呈云雾状，后期病部颜色加深，病健部界限明显，果实横切可见到维管束变褐，细胞坏死，严重时果肉褐色，木栓化，纵切可见白果柄向果脐有一道道黑筋，部分果实形成空洞。病果与病毒病易混淆。其区别是筋腐病病果病部表皮不变色，病害由果内向外发展，病毒病病果病部表皮变褐色，由外向内发展，果肉变褐色。

发病原因：主要是由于低温、高温、弱光或高夜温、缺钾、氮肥过多或病毒感染等因素造成。

防治方法：

- (1) 选用抗病品种。
- (2) 合理密植，适当疏除过密叶。
- (3) 适量施氮肥、钾肥，防止一次追施氮肥过多。果实坐果后，15~20天喷施磷酸二氢钾等复合微肥，连施2~3次。
- (4) 浇水均匀，切勿造成土壤干湿不匀的现象发生。

