

## 番茄留果有讲究！

在棚室番茄生产中，留几穗果、每一穗留多少果均有一定讲究，菜农不可有花就点，有果就留，这不仅不会给您带来种植效益的提高，而且多半会由于营养供给不足，使得果实发育不良，降低了其产量和品质，得不偿失。

生产实践证明，番茄留果与土壤肥力、植株长势、棚室环境等关系密切，菜农要以此为据，正确留果。

第一，与土壤肥力状况有关。番茄植株开花坐果能力的强弱与土壤肥力状况密切相关。肥力高，可多点花、多留果；反之，若肥力差，不宜过多留果。

第二，与植株长势有关。番茄植株长势差时，因其养分积累不足，难以满足花果正常发育，故点花留果要轻、要少。

第三，与棚室环境有关。夏秋茬番茄因其开花坐果前，受高温强光等不良条件影响，易造成第一穗花分化不良，畸形花、果多，故此建议，该茬第一穗果最好不留。如果植株旺长的话，可留第一穗花坠坠棵子，等疏果时再拿掉。

以秋延迟番茄为例，在土壤肥力状况优良的前提下，植株长势正常，第一穗果留果三个为宜，因该穗果营养供应充足，果实长得较大，留果过多宜坠住棵子，影响上部果实发育；从第二穗往上到第五穗各留四个果，这样既能使下部果实正常生长，又不至于影响上部果实的生长；第六穗果可以留五个，因为下部果实摘时，第六穗果正处于膨果期，这样随着棵上番茄果实的减少，叶片制造的营养可以满足第六穗果的生长需要。