

## 闽、粤秋冬茬茄子栽培关注要点

来源：齐树杰 编辑：RZ 发布：2015-04-17

随着瑞克斯旺工作在福建、广东地区的逐步推广，瑞克斯旺茄子在该区域栽培面积逐年稳步增加；公司茄子品种以其产量高、品质高的有点，逐渐成长为当地农民增收的一个重要选择。

华南地区秋冬季节雨水较多，空气湿度较大，各种病虫害发生较为严重；3月正是南方地区潮湿阴雨季节开始的时候，在此就福建广东地区茄子栽培过程中需要注意的事项，进行归纳，以提醒广大种植户，减少损失。要点如下：

### 1、采用嫁接苗

华南地区茄子黄萎病、枯萎病发生严重，嫁接是解决这一问题成本最低，也是最有效的办法。嫁接苗建议从专业育苗场购进，降低技术风险。

### 2、起高垄栽培

地下水位高，高垄栽培也是丰产的一个重要保证。垄面宽度 80-100cm，高度 30cm 左右较好。

### 3、适当降低栽培密度

亩定植株数控制在 1800 株以内，可适当增加株行距，降低通风难度。

### 4、及时清除老叶

中下部老叶在春节前后应及时清理干净，一方面可以增加中下部通风，还可以将之前残留在老叶片上的害虫清理出来，降低回温后害虫爆发的可能性。

### 5、早春降低浇水次数，湿度较大地区建议埋肥

随水施肥已经成为广大种植户的主要追肥方式，但在湿度较大的地区，浇水意味着棚内湿度更大，从而不利于茄子的生产；埋肥一方面减少了水使用，有保证了肥料的供应，但相对用工量大，所以一般建议在湿度较大的春节前后埋肥 1-2 次，综合效果较好。

### 6、春节后雨水较多，注意及时采摘落花

进入阴雨季节后，茄子在点花坐果后，花瓣不容易自然脱落，一旦发霉，会造成幼果随之腐烂，影响坐果。在此阶段，除在点花药中适当添加异菌脲预防外，还应个在花瓣开始衰败变软时，及时人工摘除，提高坐果率，降低损失。

### 7、蚜虫蓟马回温后发生严重，应提早预防

南方温度较高，蚜虫、蓟马等小虫发生严重，应早做预防。及时整枝、打叶，并将残枝清理干净，可有效降低虫口数量，延缓虫害的爆发。

目前市面上防治蚜虫的药剂较多，但大多在连续使用 3 次左右后，效果大减，所以种植户应多准备几种杀虫原理不同的杀蚜剂，交替使用，避免蚜类危害。