



瑞格顿 ( 35-1054 ) RZ F1

彩椒



sharing a healthy future  
共享健康未来



- 植株长势旺盛，连续座果性好，产量高
- 适合北方冬季和早春保护地，及南方冬季拱棚栽培
- 果长8-10厘米，直径8-10厘米，单果重200-250克
- 果色深绿，果型周正，成熟后转为黄色，色泽鲜艳
- 抗烟草花叶病毒病 ( Tm:0-3 )



## 栽培要点

- 1. 播种：**播种最好用育苗盘播种，在可以控制温度和湿度的温室中进行育苗。最适发芽温度为25℃，发芽时间7-8天。
- 2. 定植：**一般在4-5片叶时定植。株行距50×70厘米。定植前要进行土壤消毒；定植后，每亩用60千克酵素菌扩大菌种或其他生物菌剂灌根，防止土传病害的发生。
- 3. 施肥：**基肥如用粪肥，粪肥必须是充分熟透，使用时要与土壤混合均匀；如用畜粪每个温室(以500平方米计)10立方米，如用禽粪每个温室8立方米。追肥的施用量按作物的生长期和土壤肥力情况而定。建议增施生物菌肥，预防死棵。
- 4. 浇水：**等对椒座住，长到核桃大时再浇水。以免早浇水植株旺长，落花落果。最好保持土壤湿润使含水量稳定一致。水分时多时少会影响果实的正常发育，导致畸形果。最好能够使用滴灌系统。
- 5. 温度管理：**与其它作物相比较，甜椒对温度的反应更加敏感，移植后白天最适气温23-28℃，夜晚最适温度为15-18℃，最适土壤温度20℃，因此建议北方温室7-8月育苗。以便移栽后的幼苗在低温来临之前能有充分的时间进行根系发育，当温度超过35℃以上也会影响植株正常生长甚至不座果。
- 6. 整枝：**该品种属无限生长型，整枝时，每株保留3-4个生长健壮的茎，每茎连续留果。可根据植株生长情况侧枝留果或除去一部分小侧枝，以便通风透光。
- 7. 果实采收：**果实的采收次数决定于温室的温度，采摘时间应以上午为宜。采收后的果实要注意避免被阳光照射，最好储藏在15-16℃的环境条件下。



扫一扫，了解更多



瑞克斯旺 ( 青岛 ) 农业服务有限公司

通讯地址：青岛市即墨区移风店镇孙家村465号 / 邮编：266224

网址：www.rijkzwaan.cn / 电话：0532-87817778/5

备注：该资料由瑞克斯旺公司提供，是基于我们真实的试验基础上，仅供参考。但农业生产条件错综复杂，用户可按自己条件采纳。我们不能保证由于环境和栽培条件的原因而产生的各种种植结果。