


武威地区种植技术要点

来源：李文鸿 编辑：RZ 发布：2009-11-23



一：定植前的管理

1、农家肥腐熟

使农家肥含水 50-60%，起堆腐熟，8-10 天后倒堆，继续腐熟。

2、高温闷棚

翻地，浇透水，密封温室，高温闷棚 15-30 天。

3、施肥

完全腐熟的牛粪 8-12 方/亩，复合肥 50 公斤/亩，硫酸锌 2 公斤/亩，硫酸钾 20 公斤/亩，可适量施入其他微肥。多菌灵或敌克松 3-5 公斤/亩，杀虫剂辛硫磷 2 公斤/亩。

4、整地

清除前茬残留物，把肥料、农药均匀施入，深翻地 35 厘米，灌水浸泡。

5、起垄

沟（40 cm）+垄（80 cm）1.2m，垄高 35cm，小垄高 15-20cm,如图：

6、浇水

定植前 3-5 天在定植沟浇水，水量为沟深的 2/3 左右。

二、定植后的管理

1、定植

种苗轻拿轻放，稀植高栽浅埋，尽量保持水平一致，株距 45—50cm，密度 2000 株/亩。

2、灌根

边定植边灌根，沿子叶节往下灌根，多菌灵 600 倍+普力克 1000 倍+恶霉灵 1000 倍或 6.25%亮盾 1500 倍，100-200ml/株,隔一周再灌一次，连灌 3 次。

3、浇水

定植后 1-2 天浇足浇透定植水，蹲苗期一般再不浇水。

4、中耕

定植后 7-10 天至坐果，中耕 2-3 次，近根浅远根深。

5、覆膜

早秋，秋冬，早春茬，温度适宜时覆膜，增温保墒。

6、温湿度管理

通风 高温季节，定植后花帘遮阴 2-3 天，正常通风;低温季节，定植后当温度超过 28 度通风。

在 7-8 日中午温度过高时可适当花帘遮阴。采取各种措施使棚内温度不超过 32 度。

保持温度白天 25-30 度，晚上 12-15 度。

空气相对湿度 60%左右，保持土壤相对含水量 70%。

7、肥料使用

蹲苗结束每水必肥，少量勤浇，科学施肥。冲施肥以海法钾宝等精细肥料为主，每次 5-8 公斤/亩，叶面肥以海法魔力丰，魔力壮最好。

8、整枝、点花

植株 30-40cm 时吊秧，侧枝长到 8-10cm 时打掉，去除老叶时保证足够的功能叶，既通风透光，减少病虫害发生，又不影响产量。点花在晴天上午，可用番茄灵等。

三：病虫害防治

预防为主，综合防治，交替施药

1、真菌性病害

①晚疫病 阿米西达 1500 倍，抑快净 1200 倍。

②灰霉病 施佳乐 1200 倍液防治。

③茎基腐 普力克 1000 倍液灌根。

④根腐 恶霉灵 1000 倍液，适乐时 1200 倍液灌根

⑤白粉病 世高，百里通防治。

2、细菌性病害 可用可杀得 1000 倍，农用链霉素 3000 倍防治。

3、虫害 蚜虫，白粉虱，斑潜蝇。防治：25%阿克泰，1.8%阿维菌素，10%吡虫啉。